David WIDORY

Apport des isotopes à la compréhension des phénomènes de pollution atmosphérique : exemples dans la région de Rouyn-Noranda et le reste du monde

COMMENT DISCRIMINER LES DIFFÉRENTES SOURCES D'AÉROSOLS ?

COMMENT DISCRIMINER LES DIFFÉRENTES SOURCES D'AÉROSOLS?

COMMENT DISCRIMINER LES DIFFÉRENTES SOURCES D'AÉROSOLS?

Nous avons besoin de revenir à la notion d'atome

- Du grec ancien ατομος [atomos], « qui ne peut être divisé ».
- Plus petite partie d'un corps simple.
- Contient un noyau situé en son centre et des électrons qui "tournent" autour.
- Le noyau contient des protons et des neutrons.
- Les électrons ont une charge électrique négative.
- Les protons ont une charge électrique positive.
- Les neutrons sont neutres.

Les éléments possèdent des isotopes

- Chaque élément de la table périodique possède plusieurs isotopes
- Isotopes : atomes possédant le même nombre de protons, le même nombre d'électrons **MAIS** des nombres différents de neutrons.

Qu'implique des nombres de neutrons différents ?

Il existe des isotopes radioactifs

- Ceux-ci vont se désintégrer au cours du temps.
- Ils servent principalement à fabriquer de l'énergie.
- Mais aussi utilisés pour la datation.

Alpha Decay of U-238

$^{238}_{92}\text{U}$

...mais aussi des isotopes stables !

- Pas de décroissance radioactive.
- Par contre la distribution de ces isotopes peut être modifiée lors de certains processus.

Le corps humain contient des quantités appréciables d'isotopes stables, comme le montre ce dessin. Un individu de 50 kg renferme 225 grammes d'isotopes lourds, tels l'hydrogène 2, le carbone 13, l'azote 15, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. (Photo: Wada/Mitsubishi-Kasai)

Fry (2008)

Fry (2008)

COMMENT ÉTUDIONS-NOUS LES CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES ?

MESURES ANTI-POLLUTION

Aérosols

Gaz

Neige

IMPACT DE LA FONDERIE HORNE SUR LA CHIMIE DE LA NEIGE

LICHENS *CLADONIA RANGIFERINA* EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

- LICHEN DU CARIBOU.
- ÉTUDE SUR LES LOBES (5 DERNIERS CM; <10 ANS).

Ecological Indicators
Volume 84, January 2018, Pages 497-506

Original Articles

Atmospheric dispersion of trace metals between two smelters:
An approach coupling lead, strontium and osmium isotopes
from bioindicators

David Widory, Geneviève Vautour, André Poirier

LICHENS *CLADONIA RANGIFERINA* EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Widory *et al.*, 2018

LA QUALITÉ DE L'AIR À BEIJING

Isotopes as tracers of sources of lead and strontium in aerosols (TSP & PM_{2.5}) in Beijing

David Widory^a, Xiande Liu^b, Shuping Dong^c

30 km

10 km

2 km

5 km

- LA VILLE DE BEIJING EN VUE DES JO DE 2008, ÉTAIT CONSCIENTE DE LA NÉCESSITÉ D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SON AIR.
- LES ESSENCES PLOMBÉES AVAIENT ÉTÉ BANNIES À PARTIR DE 1997, MAIS MÊME SI UNE DÉCROISSANCE DES CONCENTRATIONS ATMOSPHÉRIQUES DE PLOMB AVAIT ÉTÉ OBSERVÉE, CES DERNIÈRES POUVAIENT ENCORE ATTEINDRE $0.18 \mu\text{G}\cdot\text{M}^{-3}$.
- LES ÉMISSIONS INDUSTRIELLES, PARTICULIÈREMENT L'INDUSTRIE NON-FERREUSE, MAIS AUSSI LA COMBUSTION DE CHARBON ÉTAIENT LES SUSPECTS HABITUELS, MAIS JUSQUE LÀ LES APPROCHES CHIMIQUES « CLASSIQUES » AVAIENT MONTRÉ LEURS LIMITES.

QUELLES SONT LES SOURCES POTENTIELLES DE PB ATMOSPHERIQUE ?

- ✓ Usines de raffinage de plomb.
- ✓ Fonderies
- ✓ Cimenteries
- ✓ Centrales thermiques
- ✓ Remise en suspension terrigènes

Encore une fois, nous pouvons discriminer les émissions de ces différentes sources.

D'OÙ PROVIENT LE PB ATMOSPHERIQUE À BEIJING ?

- POUR EXPLIQUER LA MAJORITÉ DES AÉROSOLS IL N'Y A BESOIN QUE DE 3 SOURCES DE POLLUTION (=ILS S'INSCRIVENT DANS UN TRIANGLE DE MÉLANGE).
- LE RAFFINAGE DE PB EST LA PRINCIPALE SOURCE DE POLLUTION.
- VIENT ENSUITE LA COMBUSTION DE CHARBON.
- IL EST ENFIN POSSIBLE DE DÉTECTER PONCTUELLEMENT L'IMPACT D'AUTRES SOURCES.

BIOSURVEILLANCE DES MÉTAUX LOURDS À PARIS ET DANS SA BANLIEUE

Grimmia pulvinata

Discover Atmosphere

Research

Characterizing and sourcing metal air contamination coupling concentrations and lead isotopes from moss biomonitoring in urban cemeteries

David Widory¹ · Caroline Meyer² · Sébastien Leblond² · Edson Plasencia Sánchez³ · Emeline Lequy⁴ · Yasser Morera-Gómez^{1,5}

Received: 6 September 2024 / Accepted: 21 November 2024
Published online: 02 December 2024

DISTRIBUTION SPATIALE DES MÉTAUX ET FACTEURS D'ENRICHISSEMENT

$$EF_i = \frac{\left(\frac{C_i}{C_x}\right)_{\text{échantillon}}}{\left(\frac{C_i}{C_x}\right)_{UCC}}$$

- $EF < 1$: pas d'enrichissement
- $1 < EF < 3$: enrichissement mineur
- $3 < EF < 5$: enrichissement modéré
- $5 < EF < 10$: enrichissement modérément sévère
- $10 < EF < 25$: enrichissement sévère
- $25 < EF < 50$: enrichissement très sévère
- $EF > 50$: enrichissement extrêmement sévère

ISOTOPES DU PLOMB

APPROCHE STATISTIQUE BAYÉSIENNE

MODÈLE MIXSIAR

APPROCHE STATISTIQUE BAYÉSIENNE

MODÈLE MIXSIAR

ARAIGNÉES ISOTOPIQUES À BOGOTÁ

ARAIGNÉES ISOTOPIQUES À BOGOTÁ

Trafic automobile

Impact du trafic automobile

Home

 Search

Latest News

- June 2020. Our last paper in ES&T (Bhat-tarai et al., 2019) was voted Best 2019 Paper in Environmental Science! Congratulations to Hemraj for his work.
- May 2020. Syed Asim Hussain successfully defended his PhD – Congratulations!

My students and I apply multi-isotope approaches to environmental and forensic research.

To learn more about our group, please have a look at current and recent student research.

See other projects on my research page.

Pr. David WIDORY

widory.david@uqam.ca

Dépt des Sciences de la Terre et de l'Atmosphère/ Earth and Atmosphere Sciences Dpt
UQAM/GEOTOP
Case postale 8888
Succursale Centre-Ville
Montréal, H3C 3P8, Canada
Tel: +1 (514) 987 3000/ext 1968
Fax: +1 (514) 987 3635

Take-home message

<http://www.widory.uqam.ca>